

2021학년도 1학기

수학 1

기말고사 모범답안 및 채점기준

일시 : 2021. 6. 5.(토)

1번

(a) $x e_{12} + y e_{13} + z e_{24} + w e_{34} = 0 \dots (*)$

$$x + y = 0, \quad x + z = 0, \quad y + w = 0, \quad z + w = 0$$

$$\Rightarrow x = w = 1, \quad y = z = -1 \text{ 이면 } (*) \text{ 만족.}$$

따라서 $e_{12}, e_{13}, e_{24}, e_{34}$ 는 일차종속.

(b) $x e_{12} + y e_{13} + z e_{14} + w e_{34} = 0 \dots (*)$

$$\Rightarrow x + y + z = 0, \quad x = 0, \quad y + w = 0, \quad z + w = 0$$

$$\Rightarrow y = -z = -w \text{ 이므로 } 2y = 0 \Rightarrow y = 0, \quad z = 0, \quad w = 0.$$

따라서 (*) 을 만족하는 해는 자명한 해 뿐이다.

$$\Rightarrow e_{12}, e_{13}, e_{14}, e_{34} \text{ 는 일차독립.}$$

채점기준

i) a), b) 에서 방정식 (*) 을 세우는 데에 각 5점.

행렬식을 이용한 경우, 행렬을 올바르게 적으면 각 5점.

ii) 연립방정식 계산 후 일차독립 / 일차종속 판정하는 데에 5점.

행렬식을 이용한 경우, 올바른 계산 과정을 통해 판정해야 5점.

iii) 과도한 계산 생략 (방정식 / 행렬식만 적고 바로 결론을 내리는 등) 은

ii) 에서 점수 없음.

2021학년도 1학기 수학 1 기말고사 2번 문제 모범답안 및 채점기준

[모범답안] 먼저 벡터 a 와 벡터 b 가 수직이므로 $|c| = |a||b| = \sqrt{6}$ 이다.

$$L \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = L \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - L \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = a,$$
$$L \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = L \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - L \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = a \times (b + c) - a \times c = a \times b = c$$

이므로 선형사상 L 을 나타내는 행렬을 A 라 할 때

$$A = \begin{pmatrix} a & c & a \times c \end{pmatrix}$$


이고 행렬식은 벡터 a 와 c 가 수직이므로

$$\det A = (a \times c) \cdot (a \times c) = |a \times c|^2 = |a|^2 |c|^2 = 18$$

이다.

[채점기준]

- 주어진 선형사상에 대응하는 행렬을 올바르게 표현하면 10점
- 행렬식을 벡터의 올바른 방법으로 계산 하면 10점
- 올바른 답을 도출하면 5점
- 별도의 설명 없이 구체적인 벡터를 대입하여 답을 구하면 15점



$|\vec{OA}| = |\vec{BC}| = a, |\vec{OB}| = |\vec{AC}| = b, |\vec{OC}| = |\vec{AB}| = c$
 이고, $\triangle ABC$ 의 무게 중심 G_1 이라 했을 때,
 $\triangle AOC$ 의 무게 중심 G_2 $\vec{OG}_1 \perp \vec{BG}_2$

3. (a) $\vec{BA} \cdot \vec{BO} = \vec{OB} \cdot \vec{OC}$ 임을 보라.

(Solution 1) $|\vec{BA} - \vec{BO}| = |\vec{OA}| = |\vec{BC}| = |\vec{OB} - \vec{OC}|$ 이므로

양변을 제곱하면 $|\vec{BA} - \vec{BO}|^2 = |\vec{OB} - \vec{OC}|^2$

$\Rightarrow |\vec{BA}|^2 + |\vec{BO}|^2 - 2\vec{BA} \cdot \vec{BO} = |\vec{OB}|^2 + |\vec{OC}|^2 - 2\vec{OB} \cdot \vec{OC}$ 이고,

$|\vec{BA}| = |\vec{OC}|, |\vec{BO}| = |\vec{AC}|$ 이므로 $\vec{BA} \cdot \vec{BO} = \vec{OB} \cdot \vec{OC}$ 이다.

(Solution 2)

$\triangle ABO$ 와 $\triangle COB$ 가 SSS 합동이므로 대응 도는 추 벡터의 내적도 같아야 한다.

$(\vec{BA}$ 와 $\vec{OC}), (\vec{BO}$ 와 $\vec{OB})$ 가 대응 되므로, $\vec{BA} \cdot \vec{BO} = \vec{OC} \cdot \vec{OB} = \vec{OB} \cdot \vec{OC}$

재검기준 Sol 1, Sol 2 비례도 제 2 Cosine 법칙을 쓰거나, 각도를 설정해서 풀어서 맞으면 인정.

부연 정수 없음.

3. (b) $a^2 + c^2 = 3b^2$ 을 보라.

$\vec{OG}_1 = \frac{1}{3}(\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}), \vec{BG}_2 = \vec{OG}_2 - \vec{OB} = \frac{1}{3}(\vec{OA} + \vec{OC}) - \vec{OB}$ 이므로

$\vec{OG}_1 \perp \vec{BG}_2 = 0$ 을 풀이하면

$$\frac{1}{9}(\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}) \cdot (\vec{OA} + \vec{OC} - 3\vec{OB}) = 0 \quad \text{①}$$

$$\text{따라서 } |\vec{OA}|^2 + |\vec{OC}|^2 - 3|\vec{OB}|^2 - 2\vec{OA} \cdot \vec{OB} - 2\vec{OB} \cdot \vec{OC} + 2\vec{OC} \cdot \vec{OA} = 0$$

여기서,

$$2\vec{OC} \cdot \vec{OA} = -(|\vec{OC} - \vec{OA}|^2 - |\vec{OC}|^2 - |\vec{OA}|^2) = -(b^2 - c^2 - a^2)$$

$$-2\vec{OB} \cdot \vec{OC} = |\vec{OB} - \vec{OC}|^2 - |\vec{OB}|^2 - |\vec{OC}|^2 = a^2 - b^2 - c^2$$

$$-2\vec{OA} \cdot \vec{OB} = |\vec{OA} - \vec{OB}|^2 - |\vec{OA}|^2 - |\vec{OB}|^2 = c^2 - a^2 - b^2$$

$$\Rightarrow 2\vec{OC} \cdot \vec{OA} - 2\vec{OB} \cdot \vec{OA} - 2\vec{OA} \cdot \vec{OB} = a^2 + c^2 - 3b^2$$

따라서, 맨 위의 식은 $2(a^2 + c^2 - 3b^2) = 0$ 이 되며 $a^2 + c^2 = 3b^2$ 이다.

②

채점기준 ① = 무게중심의 식과 그 수직관계의 식을 쓰면 (+5점)

$$\text{굳이 } \vec{BG}_2 = \frac{1}{3}(\vec{OA} + \vec{OC}) - \vec{OB} \text{ 가 아냐고, 예로 들면 } \vec{BG}_2 = \frac{1}{3}(\vec{BA} + \vec{BO} + \vec{BC})$$

를 써도 인건.

② = ①에서 쓴 식과 함께 (제 2 Cosine 법칙 (위의 답) or 삼각형의 중선관계) 등을 이용하여

$$a^2 + c^2 = 3b^2 \text{ 을 바르게 도출하면 } (+10)$$

이런 다른 풀이 (좌표를 이용한 풀이, 기하적인 풀이...)는 특별점수 없이 맞으면 +15, 아니면 0.

4번.

(a) 주어진 행렬을 A 라 하자.

A 가 역행렬을 가지지 않는 것은 $\det A = 0$ 인 것과 동치이다.

따라서 $\det A = 0$ 인 (x, y, z) 를 모으면 C 를 구할 수 있다. +5

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & x-y-z & 2x & 2x \\ 0 & 2y & y-z-x & 2y \\ 0 & 2z & 2z & z-x-y \end{vmatrix}$$

행렬식의
귀납적 정의 \rightarrow

$$= \begin{vmatrix} x-y-z & 2x & 2x \\ 2y & y-z-x & 2y \\ 2z & 2z & z-x-y \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} -(x+y+z) & 0 & 2x \\ 0 & -(x+y+z) & 2y \\ x+y+z & x+y+z & z-x-y \end{vmatrix}$$

$$= (x+y+z)^2 \begin{vmatrix} -1 & 0 & 2x \\ 0 & -1 & 2y \\ 1 & 1 & z-x-y \end{vmatrix}$$

$$= (x+y+z)^2 \{ (-1)(-(z-x-y)-2y) + (+1)(0 \cdot 2y - (-1)2x) \}$$

$$= (x+y+z)^3$$

즉, $C = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \det A = (x+y+z)^3 = 0 \}$


$= \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x+y+z = 0 \}$ 이다. +10

(채점 기준) " A^{-1} 이 존재하지 않음 $\Leftrightarrow \det A = 0$ "의 동치조건을
활용한 경우 (+5점) - 일차공식임을 이용해도 점수 부여
행렬식을 계산하여 C 를 맞게 찾아낸 경우 (+10점)

- 행렬식 계산에서 x, y, z 에 대한 다항식 형태까지는 정확히 구했으나 그 이후 사소한 감점으로 답이 틀린 경우는 3점 감점 (+7점)

(b) $C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\}$ 으로 평면이 된다.

따라서 구 S 와 C 는 만나지 않거나, 원 모양의 교선을 가진다. +5



$x + y + z = 0$ 라의 교선

점과 평면 사이의 거리를


$$\frac{|1+2+3|}{\sqrt{1^2+1^2+1^2}} = 2\sqrt{3}$$

이므로 구 S 와 C 는 교선을 가지며,

이는 원이다. 따라서, $S \cap C$ 의

길이는

$$2 \times \pi \times \sqrt{4^2 - (2\sqrt{3})^2} = 4\pi$$



(채점기준) $S \cap C$ 가 원이므로 원의 둘레를 계산하면 됨을 알고

이 원의 반지름을 구하려고 한 경우 (+5점)

- (a)에서 구한 C 가 틀린 답이더라도 비슷한 기하적 접근으로 풀 경우 5점 부여

$S \cap C$ 의 길이를 안맞게 계산한 경우 (+5점)

- (a)에서 풀이가 틀리더라도 $C: x + y + z = 0$ 에 대해 (b)는 풀 경우 만점 부여

5번 채점 기준

$$(a) X(t) = (e^t \cos t, 1, e^t \sin t)$$

$$\Rightarrow Q = X\left(\frac{\pi}{4}\right) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}e^{\frac{\pi}{4}}, 1, \frac{\sqrt{2}}{2}e^{\frac{\pi}{4}}\right) \quad \text{---} 4$$

$$X'(t) = (e^t(-\sin t + \cos t), 0, e^t(\sin t + \cos t)) \text{ 에서}$$

$$X'\left(\frac{\pi}{4}\right) = (0, 0, \sqrt{2}e^{\frac{\pi}{4}}) \quad \text{---} 4$$

$$\therefore x = \frac{\sqrt{2}}{2}e^{\frac{\pi}{4}}, y = 1 \text{ 이 직선의 방정식이다. ---} 2$$

$$* x = \frac{\sqrt{2}}{2}e^{\frac{\pi}{4}}, y = 1 \text{ 대신 } l = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}e^{\frac{\pi}{4}}, 1, t\right) \quad t \in \mathbb{R} \text{ 등 맞은 매개변수 모두 인정}$$

(b)
sol 1) l, l_1 에 동시에 수직인 벡터 $\vec{n} = \frac{X'(\frac{\pi}{4})}{|X'(\frac{\pi}{4})|} \times \vec{v} = (1, -1, 0) \quad \text{---} 5$

$$l, l_1 \text{의 사이 거리 } d = \frac{\overrightarrow{PQ} \cdot \vec{n}}{|\vec{n}|} \text{ 이다. ---} 5$$

$$\Rightarrow |d| = \frac{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}e^{\frac{\pi}{4}}, 1, \frac{\sqrt{2}}{2}e^{\frac{\pi}{4}} - 1\right) \cdot (1, -1, 0)}{|(1, -1, 0)|} = \frac{1}{2}e^{\frac{\pi}{4}} - \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \text{---} 5$$

$$* l \text{ 위의 아무 점 } Q', l_1 \text{ 위의 아무 점 } P' \text{ 을 이용하여 } \frac{\overrightarrow{P'Q'} \cdot \vec{n}}{|\vec{n}|} \text{ 으로 계산해도 인정}$$

* \vec{n} 값 계산이 틀렸더라도 d 공식 맞으면 5점 부여

sol 2) $\begin{cases} l \text{ 위의 한 점 } A\left(\frac{\sqrt{2}}{2}e^{\frac{\pi}{4}}, 1, t\right) \\ l_1 \text{ 위의 한 점 } B(s, s, s+1) \end{cases} \Rightarrow \overrightarrow{BA} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}e^{\frac{\pi}{4}} - s, 1 - s, t - s - 1\right)$

\overrightarrow{BA} 라 l, \overrightarrow{BA} 라 l_1 이 모두 수직인 경우의 $|\overrightarrow{BA}|$ 가 l 라 l_1 의 거리이므로

$$\begin{cases} \overrightarrow{BA} \cdot X'\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0 & \Rightarrow t - s - 1 = 0 \\ \overrightarrow{BA} \cdot (1, 1, 1) = 0 & \Rightarrow \frac{\sqrt{2}}{2}e^{\frac{\pi}{4}} - s + 1 - s + t - s - 1 = 0 \end{cases} \quad \text{---} 10$$

$$\text{연립하여 } t = \frac{\sqrt{2}}{4}e^{\frac{\pi}{4}} + \frac{3}{2} \quad s = \frac{\sqrt{2}}{4}e^{\frac{\pi}{4}} + \frac{1}{2} \text{ 이 된다.}$$

$$\text{이때 길이 } d = |\overrightarrow{BA}| = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}e^{\frac{\pi}{4}} - s\right)^2 + (1 - s)^2 + (t - s - 1)^2} = \frac{1}{2}e^{\frac{\pi}{4}} - \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \text{---} 5$$

* 두 연립방정식이 정확히 세 개 나타야만 10점 부여. (수직하다 언급만으로도 정수 없음.)

sol3) l_1 위의 한 점 $B(s, s, 1+s)$

B 에서 l_2 에 내린 수선의 발을 H 라 하면. (Q 는 (α) 에서 $X(\frac{\pi}{4})$ 로 l_1 위의 점)

$$\vec{BH} = \vec{QB} - \vec{QH} = \vec{QB} - \frac{\vec{QB} \cdot X'(\frac{\pi}{4})}{\|X'(\frac{\pi}{4})\|^2} X'(\frac{\pi}{4})$$

$$= (s - \frac{\sqrt{2}}{2} e^{\frac{\pi}{4}}, s-1, 0)$$

$\Rightarrow f(s) = |\vec{BH}|^2$ 이라고 정의하면.


$$f(s) = (s-1)^2 + (s - \frac{\sqrt{2}}{2} e^{\frac{\pi}{4}})^2 \quad \text{10.}$$

이 $f(s)$ 가 최소가 되는 값이 l_1 과 l_2 사이 거리 이고 $f(s)$ 는 $s = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{4} e^{\frac{\pi}{4}}$ 일때
최소값을 가지므로.

$$d = \sqrt{f(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{4} e^{\frac{\pi}{4}})} = \frac{1}{2} e^{\frac{\pi}{4}} - \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \text{15.}$$

2021학년도 1학기 수학 1 기말고사 6번 문제 모범답안 및 채점기준

[모범답안]



$\theta = \frac{\pi}{3}, -\frac{\pi}{3}$ 일때 $3 = 2 + 2 \cos \theta$ 이므로 적분 구간은 $-\frac{\pi}{3}$ 에서 $\frac{\pi}{3}$ 까지.
대칭성에 의해 $\theta = 0$ 에서 $\theta = \frac{\pi}{3}$ 까지만 적분을 구해주고 적분값에 2를 곱해줘도 된다.

$$\begin{aligned}
 (\text{넓이}) &= 2 \left(\int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{2} (2 + 2 \cos \theta)^2 d\theta - \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{2} 3^2 d\theta \right) \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{3}} 4 \cos^2 \theta + 8 \cos \theta - 5 d\theta \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{3}} (2 \cos 2\theta + 2) + 8 \cos \theta - 5 d\theta \\
 &= \sin 2\theta + 8 \sin \theta - 3\theta \Big|_0^{\frac{\pi}{3}} = \frac{9}{2} \sqrt{3} - \pi
 \end{aligned}$$

[채점기준]

- 전혀 엉뚱한 영역에 대한 넓이를 구했다면 0점
- $3 \leq 2 + 2 \cos \theta$ 인 θ 범위를 구하여 적분 구간을 적절하게 잡았다면 5점 부여
- 적분식을 옳게 세운 경우, 학생이 극좌표계로 주어진 그래프의 넓이를 구하는 방법에 대해서 잘 알고있다 여겨 12점 부여
- 올바른 계산 결과값을 구한 경우 8점 부여 (영역의 반만 구한 뒤, 2배를 하지 않은 경우 계산 실수로 여겨 8점 감점)

문제 7. [30점] 극좌표계에서

$$r(\theta) = 1 + \cos \theta \quad (0 \leq \theta \leq \pi)$$

로 표현된 곡선 $X(\theta)$ 에 대해 다음 물음에 답하시오.

(a) (15점) $X(\theta)$ 를 $X(0)$ 에서부터 잰 호의 길이로 매개화하시오.

(b) (15점) 위 곡선의 $\theta = \frac{\pi}{3}$ 에서의 곡률을 구하시오.

(a) sol), 직교 좌표계에서 주어진 곡선은,

$$X(\theta) = r(\theta) (\cos \theta, \sin \theta)$$

여기서 곡선의 속력은,

$$\begin{aligned} |X'(\theta)| &= \sqrt{r^2 + (r')^2} \\ &= \sqrt{2 + 2\cos \theta} \\ &= \left| 2 \cos \frac{\theta}{2} \right| \\ &= 2 \cos \frac{\theta}{2} \end{aligned}$$

따라서 $X(0)$ 부터 $X(\theta)$ 까지의 곡선의 길이는

$$\begin{aligned} s(\theta) &= \int_0^\theta |X'(\theta)| d\theta \\ &= \int_0^\theta 2 \cos \frac{\theta}{2} d\theta \\ &= 4 \sin \frac{\theta}{2} \end{aligned}$$

6 들바는 길이 구는 것 시도.
 $\int_0^\theta \sqrt{r^2 + (r')^2} d\theta$

또한 $\theta(s) = 2 \arcsin \left(\frac{s}{4} \right)$ 이므로,

$X(\theta)$ 를 호의 길이로 매개화하면,

$$\tilde{X}(s) = \left(1 + \cos \left(2 \arcsin \left(\frac{s}{4} \right) \right) \right) \cdot \left(\cos \left(2 \arcsin \left(\frac{s}{4} \right) \right), \sin \left(2 \arcsin \left(\frac{s}{4} \right) \right) \right) \quad \text{이다. } (*)$$

(단, $0 \leq s \leq 4$) 3 □

체중기준 • (*)에서, $\left(\left(1 - \frac{s^2}{8} \right) \left(2 - \frac{s^2}{8} \right), \frac{s}{2} \left(2 - \frac{s^2}{8} \right) \sqrt{1 - \frac{s^2}{16}} \right)$ 도 인정.

• 호의 길이로 재매개화 한 뒤 극좌표계로 표현하였을 때, $(\tilde{r}(s), \tilde{\theta}(s))$ 가 아닌,

$\tilde{r}(\theta) = 1 + \cos \left(2 \arcsin \left(\frac{s}{4} \right) \right)$ 만으로는 부족한 표현이므로 그냥 처리함.

(b) sol). 곡률은

$$k = \frac{1}{|x'|} \cdot \left| \left(\frac{x'}{|x'|} \right)' \right| = \frac{|x' \times x''|}{|x'|^3} \quad \text{--- (*)}$$

이므로, 정의에 따라 계산하면 $k = +\frac{\sqrt{3}}{2}$ 이다. └ 15 □

채점기준. • 곡률벡터 $(0, -\frac{\sqrt{3}}{2})$ 까지만 구했을 경우 10점.

• (*) 이 상응하는 곡률벡터, 혹은 곡률 공식이 맞을 경우 5점 부여.

문제 8

$X(t) = (t, t^2)$ 이므로, $|X'(t)| = |(1, 2t)| = \sqrt{1 + 4t^2}$ 이다.

질량은 $m := \int_X \mu \, ds = \int_0^{\sqrt{2}} \mu(t) |X'(t)| \, dt = \int_0^{\sqrt{2}} (1 + 4t^2) \, dt = \frac{11}{3}\sqrt{2}$ 이다. └ 답이 맞으면 +5점.

질량중심은 $\bar{x} := \frac{1}{m} \int_X x \mu \, ds$, $\bar{y} := \frac{1}{m} \int_X y \mu \, ds$ 이므로,

$$m\bar{x} := \int_X x \mu \, ds = \int_0^{\sqrt{2}} x(t) \mu(t) |X'(t)| \, dt = \int_0^{\sqrt{2}} t(1 + 4t^2) \, dt = 5,$$

$$m\bar{y} := \int_X y \mu \, ds = \int_0^{\sqrt{2}} y(t) \mu(t) |X'(t)| \, dt = \int_0^{\sqrt{2}} t^2(1 + 4t^2) \, dt = \frac{58}{15}\sqrt{2} \text{ 이다.}$$

$$\text{답 : } m = \frac{11}{3}\sqrt{2}, (m\bar{x}, m\bar{y}) = \left(5, \frac{58}{15}\sqrt{2}\right)$$

코, y 정의를 행시한 경우 각 5점. (정의 틀리면 점수 없음, 선적분 정의를 명확한
전반 형태를 구해야 함).

답까지 맞으면 각 5점.