

2018년 영계정하기

수학 및 영계 2 중간고사

$$1. f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{\sqrt{x^4 + x^2y^2 + y^4}} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$$(a) \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \left| \frac{xy^2}{\sqrt{x^4 + x^2y^2 + y^4}} \right| = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} |y| \cdot \frac{\sqrt{x^2y^2}}{\sqrt{x^4 + x^2y^2 + y^4}}$$

$$\leq \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\sqrt{x^4 + x^2y^2 + y^4}}{\sqrt{x^4 + x^2y^2 + y^4}} \cdot |y| = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} |y| = 0$$

$$\therefore \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 0 \Rightarrow \text{연속}$$

* $x^4 + y^4 + x^2y^2 \geq 3x^2y^2$ 를 사용했을 시 자축, y축의 경우를 언급하지 않은 경우

극좌표계를 사용했을 시 분모가 0이 아님을 명시하지 않은 경우

$\Rightarrow -2$ 점

$$(b) D_1 f(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t, 0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{0 \cdot t^2}{\sqrt{t^4}} = 0$$

$$D_2 f(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(0, t)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{0 \cdot t}{\sqrt{t^4}} = 0$$

(c) 미분가능하기 위해서는 $D_v f = \text{grad} f \cdot v$ 를 만족해야 한다.

$$v = (1, 1) \text{ 이라 하면 } D_v f = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t, t) - f(0, 0)}{\sqrt{2}t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^3}{\sqrt{3t^4}} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^3}{\sqrt{2}t}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^2}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ 이다. 이는 우변 } \text{grad} f \cdot v = (0, 0) \cdot (1, 1) = 0$$

과 다르다. \Rightarrow 미분불가능하다.

$$2. x^3 + y^3 + z^3 + 6xyz = 1$$

$$3z^2 \frac{\partial z}{\partial x} + 3x^2 + 6yz + 6xy \frac{\partial z}{\partial x} = 0$$

$$(3z^2 + 6xy) \frac{\partial z}{\partial x} + 3x^2 + 6yz = 0$$

$$z^2 + 2xy \neq 0 \Rightarrow \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{-x^2 - 2yz}{z^2 + 2xy}$$

* 부분접수 없음

3. (a) 가장 빨리 함수값이 증가하는 방향은 $\text{grad} f$ 와
평행하다. $\text{grad} f = (-2xe^{-x^2-2y^2}, -4ye^{-x^2-2y^2})$

$$= (r \cos \theta, r \sin \theta) \quad (r = \sqrt{(-2xe^{-x^2-2y^2})^2 + (-4ye^{-x^2-2y^2})^2})$$

$$\therefore \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{r \sin \theta}{r \cos \theta} = \frac{-4ye^{-x^2-2y^2}}{-2xe^{-x^2-2y^2}} \Bigg|_{(x,y)=(1,1)} = \frac{4e^{-3}}{2e^{-3}} = 2$$

* $\text{grad} f$ 를 제대로 구하면 3점

(b) $g(x, y, z) = e^{-x^2-2y^2} - z$ 라 하면 $(1, 1, e^{-3})$ 은

$g(x, y, z) = 0$ 인 등위면 위의 점이다.

$$\text{grad} g = (-2xe^{-x^2-2y^2}, -4ye^{-x^2-2y^2}, -1) \rightarrow \text{grad} g(1, 1, e^{-3}) = (-2e^{-3}, -4e^{-3}, -1)$$

\rightarrow 등위면의 접평면은 $(-2e^{-3}, -4e^{-3}, -1) \cdot (x-1, y-1, z-e^{-3}) = 0$


$$\Rightarrow 2x + 4y + e^3 z - 7 = 0$$

* $\text{grad} g$ 를 제대로 구하면 3점

4. 힌트를 이용하면 $f(x) = |x - F_1| + |x - F_2|$

$$\Rightarrow \text{grad } f(x) = \frac{x - F_1}{|x - F_1|} + \frac{x - F_2}{|x - F_2|} \quad \text{는 두 단위벡터의}$$

합으로 나타난다.



두 단위벡터의 사이각을 2θ 라고 하면

$$|\text{grad } f| = \sqrt{1 + 1 + 2\cos 2\theta} = 2\cos \theta$$

그러므로 $\text{grad } f$ 와 $\frac{x - F_1}{|x - F_1|}$ 의 사이각은 θ 이고

마찬가지로 $\text{grad } f$ 와 $\frac{x - F_2}{|x - F_2|}$ 의 사이각은 θ 이다.

↓ +10.

책 461p. 이 나란사 ↑ 을 이용해 풀 경우, 식을 바르게 명시하면 5점.

$$V_* = V - 2 \frac{V \cdot N}{N \cdot N} N \quad \text{이쪽 풀이가 올바르면 만점.}$$

* 그외 도형을 이용한 풀이는 안여한 경우 만점, 그외 뉘점수 없음.

$$5. f(x, y) = \int_{y^2}^x \frac{e^{xt^2}}{t} dt$$

$$D_1 f(x, y) = \frac{e^{x^3}}{x} + \int_{y^2}^x \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{e^{xt^2}}{t} \right) dt$$

$$= \frac{e^{x^3}}{x} + \int_{y^2}^x t e^{xt^2} dt$$

$$= \frac{3}{2x} e^{x^3} - \frac{1}{2x} e^{xy^4}$$

4점

$$D_2 f(x, y) = -\frac{e^{xy^4}}{y^2} \cdot 2y = -2 \frac{e^{xy^4}}{y}$$

4점

$$\therefore \text{grad } f(2, 1) = \left(\frac{1}{4}(3e^8 - e^2), -2e^2 \right)$$

2점

* 계산이 틀리면 무원점 X

$$5. f(x, y) = \int_{y^2}^x \frac{e^{xt^2}}{t} dt$$

$$D_1 f(x, y) = \frac{e^{x^3}}{x} + \int_{y^2}^x \frac{2(e^{xt^2})}{t} dt$$

$$= \frac{e^{x^3}}{x} + \int_{y^2}^x t e^{xt^2} dt$$

$$= \frac{3}{2x} e^{x^3} - \frac{1}{2x} e^{xy^4}$$

4점

$$D_2 f(x, y) = -\frac{e^{xy^4}}{y^2} \cdot 2y = -2 \frac{e^{xy^4}}{y}$$

4점

$$\therefore \text{grad } f(2, 1) = \left(\frac{1}{4}(3e^8 - e^2), -2e^2 \right)$$

2점

* 계산이 틀리면 무관점 X

6. $f(x, y) = e^x \log(1+y)$

(a) $e^x = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)$

$\log(1+y) = y - \frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{3}y^3 + o(y^3)$

$e^x \log(1+y) = y - \frac{1}{2}y^2 + xy - \frac{1}{2}xy^2 + \frac{1}{2}x^2y + \frac{1}{3}y^3 + o(\sqrt{x^2+y^2})$

테일러 전개에 유망성이 의해

$T_3 f(x, y) = y - \frac{1}{2}y^2 + xy - \frac{1}{2}xy^2 + \frac{1}{2}x^2y + \frac{1}{3}y^3$

(b) $D_1^4 f(x, y) = e^x \log(1+y)$ $D_1 D_2^3 f(x, y) = \frac{2e^x}{(1+y)^3}$
 $D_1^3 D_2 f(x, y) = \frac{e^x}{1+y}$ $D_2^4 f(x, y) = -\frac{6e^x}{(1+y)^4}$
 $D_1^2 D_2^2 f(x, y) = -\frac{e^x}{(1+y)^2}$

$M_4 = \max \{ |D_{i_1 \dots i_4} f(0.1t, 0.1t)| : \begin{matrix} 1 \leq i_1, \dots, i_4 \leq 2 \\ 0 \leq t \leq 1 \end{matrix} \}$
 $\leq \frac{6e^{0.1}}{1^4} < 7.2$

이므로

$|R_3| \leq M_4 \cdot \frac{(0.1+0.1)^4}{4!} < 7.2 \times \frac{1}{4!} \times 0.2^4 < 5 \times 10^{-4}$

* (a) 다항식을 간단히 구해야만 3점, $o(\sqrt{x^2+y^2})$ 를 (혹은 테일러식) 잘 쓰면 1점
 '테일러 전개에 유망성' 언급 1점

(b) 4계미분 계산 4점
 M_4 계산 3점, R_3 의 공식 정확히 언급을 사용 3점

#17. $g(x,y,z) := \underline{z^2 + xy^2 - 1 = 0}$ 일때 $f(x,y,z) := x^2 + y^2 + z^2$
 이 최소가 되는 (x,y,z) 를 구해야 한다. ①

$$\text{grad } f(x,y,z) = 2(x,y,z)$$

$$\text{grad } g(x,y,z) = (y^2, 2xy, 2z).$$

$$\text{grad } f(x,y,z) = 0 \Rightarrow x=y=z=0$$

$$\Rightarrow z^2 + xy^2 - 1 = 0 \text{ 을 만족하지 않음.}$$

\therefore 주어진 곡면 위에서는 $\text{grad } f(x,y,z) \neq 0$ 이다. ... (*)

\therefore 라그랑주 승수법에 의해 (x,y,z) 가 주어진 곡면에서 f 의 극점이면

$$(y^2, 2xy, 2z) = 2\lambda(x,y,z) \quad \text{┆ 5점}$$

인 실수 λ 가 존재한다.

$$\begin{cases} 2\lambda x = y^2 & \dots \text{ ②} \\ 2\lambda y = 2xy & \dots \text{ ③} \\ 2z = 2\lambda z & \dots \text{ ④} \end{cases}$$

$$\text{④} \Rightarrow z=0 \text{ or } \lambda=1.$$

• $\lambda=1$ 인 경우: $\lambda=1$ 을 ③에 대입하면 $2y = 2xy$

$$\Rightarrow x=1 \text{ or } y=0.$$

- ②에 $x=1$ 과 $\lambda=1$ 을 대입하면 $y^2=2$.

$x=1, y^2=2$ 이면 ①을 만족하는 실수 z 가 존재하지 않음.

- ②에 $y=0$ 과 $\lambda=1$ 을 대입하면 $x=0$.

$x=0, y=0$ 이면 ①로부터 $z = \pm 1$. $\rightarrow (0,0,1), (0,0,-1) \dots (**)$

• $z=0$ 인 경우: $z=0$ 을 ①에 대입하면 $xy^2=1$.

$$\left. \begin{array}{l} xy^2=1 \text{ 을 ②에 대입하면 } x^2 = \frac{1}{y} \\ xy^2=1 \text{ 을 ③에 대입하면 } y^2 = \frac{1}{x} \end{array} \right\} \Rightarrow y^2 = 2x^2 \Rightarrow y = \pm\sqrt{2}x.$$

$$z=0, y = \pm\sqrt{2}x \text{ 를 ①에 대입하면 } 2x^3 - 1 = 0 \Rightarrow x = 2^{-\frac{1}{3}}$$

$$\Rightarrow y = \pm\sqrt{2}x \text{ 이므로 } y = \pm 2^{\frac{1}{6}}$$

$$\rightarrow (2^{-\frac{1}{3}}, 2^{\frac{1}{6}}, 0), (2^{-\frac{1}{3}}, -2^{\frac{1}{6}}, 0) \dots (***)$$

┆ 12점

$$f(0,0,1) = f(0,0,-1) = 1.$$

$$f(2^{-\frac{1}{3}}, 2^{\frac{1}{6}}, 0) = f(2^{-\frac{1}{3}}, -2^{\frac{1}{6}}, 0) = 3 \cdot 2^{-\frac{2}{3}} > 1.$$

∴ 곡면 $x^2 + y^2 - 1 = 0$ 위의 점 중 원점과 가장 가까운 점은 $(0,0,1), (0,0,-1)$ 이며, 최단거리는 1임을 안다. 15점.
정답.

* 채점 기준

- (*)를 쓰지 않으면 첫 5점 중 3점 감점.
- (**)와 (***)의 네 점 중 하나라도 빠지면 부분점수 없음.

#8. $f(x,y) = x^3 - y^3 - xy^2$

$\Rightarrow \text{grad} f(x,y) = (3x^2 - y^2, -3y^2 - x) = (0,0)$ 인 (x,y) 가 임계점이다.

$\Rightarrow y = 3x^2, x = -3y^2$.

연립해서 풀면 $(0,0), (-\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ 가 임계점임을 안다. $\lrcorner +5점$

이제 행렬 $f''(x,y) = \begin{pmatrix} D_1^2 f(x,y) & D_1 D_2 f(x,y) \\ D_2 D_1 f(x,y) & D_2^2 f(x,y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6x & -1 \\ -1 & -6y \end{pmatrix}$ $\lrcorner +5점$

$\cdot f''(0,0) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$

$\det f''(0,0) = -1 < 0$ 이므로 $(0,0)$ 은 안장점이다.

$\cdot f''(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}) = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$

$\det f''(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}) = 4 - 1 = 3 > 0$ 이고 $-2 < 0$ 이므로 $(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ 은 극대점이다.

$\lrcorner +5점.$

* 채점 기준

- 임계점은 모두 맞았으나, 둘 중 한 점의 극대·극소·안장점 여부를 잘못 판정하면 마지막 5점 중 2점만 부여함.

$$\#9. \quad \bar{F}(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$$

$$\Rightarrow \bar{F}\left(2, \frac{\pi}{6}\right) = (\sqrt{3}, 1).$$

$$\therefore 3 = \det(G \circ \bar{F})'\left(2, \frac{\pi}{6}\right)$$

$$= \det\left(G'(\bar{F}(2, \frac{\pi}{6})) F'(2, \frac{\pi}{6})\right)$$

$$= \det(G'(\sqrt{3}, 1) F'(2, \frac{\pi}{6}))$$

$$= \det G'(\sqrt{3}, 1) \det F'(2, \frac{\pi}{6}). \dots (*)$$

$$F'(r, \theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix} \text{ 에서 } \det F'(r, \theta) = r \text{ 이므로}$$

$\det F'(2, \frac{\pi}{6}) = 2$ 이다. 이것을 (*)에 대입하면

$$\det G'(\sqrt{3}, 1) = \frac{3}{2} \quad \text{5점}$$

을 얻는다. $G: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 는 선형사상이므로, $G'(x, y)$ 는 선형사상 G 에 대응되는 행렬과 같은 역할을 해서 (x, y) 에 의존하지 않는다.

$$\therefore \det G'(1, 1) = \det G'(\sqrt{3}, 1) = \boxed{\frac{3}{2}} \quad \text{정답. } \text{10점.}$$

$$\# \textcircled{0}. X(t) = (t, \sin t, \cos t) \quad (1 \leq t \leq e^2)$$

$$\Rightarrow X'(t) = (1, \cos t, -\sin t).$$

$$\therefore \int_C \log x \, dx - z \, dy + y \, dz = \int_1^{e^2} (\log t, -\cos t, \sin t) \cdot (1, \cos t, -\sin t) \, dt \quad \text{5점}$$

$$= \int_1^{e^2} (\log t - \cos^2 t - \sin^2 t) \, dt$$

$$= \int_1^{e^2} (\log t - 1) \, dt$$

$$= [t \log t - t - t]_1^{e^2}$$

$$= \boxed{2}$$

정답. 10점.

$$11. \quad \varphi = yz^2 \sin \alpha + \cosh(1+yx) + \frac{1}{2}z^2$$

라고 하자.

그럼 $\text{grad} \varphi = \vec{F}$ 이다.

벡터장이 정의된 xyz -공간은 연결되어 있으므로

잠재함수의 유일성에 의해.

$$\varphi_c = yz^2 \sin \alpha + \cosh(1+yx) + \frac{1}{2}z^2 + C \text{ 이}$$

우리가 구하려는 모든 잠재함수이다.

채점기준.

- ① φ 만 구한 경우 3점
- ② φ_c 까지 구한 경우 5점
- ③ φ_c 가 모든 잠재함수임을 보이면 5점 (유일성)

* 유일성을 $\frac{\partial \varphi}{\partial z} = yz^2 \cos \alpha$ 로부터

$$\varphi = yz^2 \sin \alpha + h(y, x) + C_1 \text{ 이고}$$

$$\frac{\partial \varphi}{\partial y} = \frac{\partial h}{\partial y}(y, x) = z \sinh(1+yx) \text{ 이므로.}$$

$$h = x \cosh(1+yx) + g(x) + C_2 \text{ 이고.}$$

이러한 방법의 의해 $g = \frac{1}{2}z^2$ 이다.

따라서

$$\varphi = yz^2 \sin \alpha + \cosh(1+yx) + \frac{1}{2}z^2 + C \text{ :로 보여도 인정.}$$

#12 (a). $F(x, y) = \left(\frac{-y}{x^2+y^2}, \frac{x}{x^2+y^2} \right)$ 에서.

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{-y}{x^2+y^2} \right) = \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}, \quad \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{x^2+y^2} \right) = \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}.$$

따라서 F 는 닫힌 벡터장이다.

└ 5점.

(b) $H = \{(x, y) \mid x > 0\}$ 은 열린 볼록 집합이므로

푸앵카레 준동정리에 의해 잠재함수를 갖는다.

$$\varphi = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \text{ 라고 하면}$$

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x} = \frac{1}{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2} \times -\frac{y}{x^2} = \frac{-y}{x^2+y^2}$$

$$\frac{\partial \varphi}{\partial y} = \frac{1}{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2} \times \frac{1}{x} = \frac{x}{x^2+y^2} \text{ 이다.}$$

따라서 φ 는 F 의 잠재함수이다. └ 5점.

(c) F 가 잠재함수를 가지는 선적분의 기본정리에 의해

$$\begin{aligned} \int_x F \cdot ds &= \varphi(1, 1) - \varphi(1, -1) \quad \left(\begin{array}{l} \varphi = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \\ X(t_0) = (1, -1) \\ X(t_1) = (1, 1) \end{array} \right) \\ &= \arctan(1) - \arctan(-1) \\ &= \frac{\pi}{4} - \left(-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{2}. \quad \text{└ 5점} \end{aligned}$$

* 채점 기준.

(a) 계산이 틀리거나 없으면 0점.

(b) 잠재함수의 존재성만 보인 경우 -3점.

(c) 각 원소 벡터장의 성질을 이용해 많이 맞으면 5점.

$-\frac{\pi}{2}, 90^\circ$ 라고 답을 쓴 경우 -3점.