

수학 2 채점기준

$$1. f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{|x+y|} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

(a) f 는 $(0, 0)$ 에서 연속인지 판정

$$|f(x, y)| = \frac{|xy|}{|x+y|} \leq \frac{(|x|+|y|)^2}{4(|x|+|y|)} = \frac{1}{4}(|x|+|y|)$$

(by 산술-기하)

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} |f(x, y)| \leq \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{1}{4}(|x|+|y|) = 0$$

$$\therefore \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 0 = f(0, 0)$$

따라서 $(0, 0)$ 에서 연속.

* 계산 실수 및 부등식 오류시 부분점수 없음.

ex) i) $\frac{|xy|}{|x+y|} \leq \frac{|xy|}{2\sqrt{|xy|}} = \frac{1}{2}\sqrt{|xy|}$
 \hookrightarrow 분모 0 가능 틀린 식.

ii) $x+y \geq 2\sqrt{|xy|} \leftarrow x \geq 0, y \geq 0$ 일때만 성립.

iii) $|x|+|y| \geq |x+y|$

$$\frac{|xy|}{|x|+|y|} \leq \frac{|xy|}{|x+y|} \leftarrow \text{분모 0 가능 틀린 식.}$$

iv) $\lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^2 \sin\theta \cos\theta}{|r \sin\theta| + |r \cos\theta|} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{|r| \sin\theta \cos\theta}{|\sin\theta| + |\cos\theta|} \rightarrow$ 유계 값을 안보이면 0점.

(b). f 는 $(0,0)$ 미분가능인지 판정.

①. (1.17)에서 방향미분 계산.

$$D_{(1,1)}f(0,0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t,t) - f(0,0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{2|t|} : \text{반산 (좌극한과 우극한이 다름)}$$

따라서 미분 불가능하다. \downarrow 8점.

②. 미분가능하다면 방향벡터 $\forall v$ 에 대해

$$\text{grad } f(0,0) \cdot v = D_v f(0,0) \text{ 이 성립 } \downarrow \text{ 4점}$$

$$D_1 f(0,0) = 0 \quad D_2 f(0,0) = 0.$$

$v = (a,b)$ 일때

$$D_v f(0,0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(ta, tb) - f(0,0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{ab}{|a|+|b|} \cdot \frac{t}{|t|}$$

$a, b \neq 0$ 이면 $D_v f(0,0) : \text{반산! } \text{grad } f(0,0) \cdot v = 0$ 이므로

f 는 원점에서 미분불가능 \downarrow 8점

③. f 가 미분가능하다면 모든 벡터 v 에 대해

$$\lim_{|v| \rightarrow 0} \frac{|f(0,0) + v| - f(0,0) - a \cdot v|}{|v|} = 0 \text{ 인 } a \text{ 가 존재 } \downarrow \text{ 4점}$$

$$a = \text{grad } f(0,0) = (0,0) \text{ 이므로}$$

$$\lim_{|v| \rightarrow 0} \frac{|f(v)|}{|v|} = 0 \text{ 이어야 미분가능.}$$

$$v = (a,b) \quad \lim_{|v| \rightarrow 0} \frac{|f(v)|}{|v|} = \lim_{|v| \rightarrow 0} \frac{|ab|}{\sqrt{a^2+b^2} \cdot (|a|+|b|)}$$

$$a=b \text{ 라 하면 } \longrightarrow = \lim_{|a| \rightarrow 0} \frac{a^2}{2\sqrt{2} a^2} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \neq 0. \text{ 따라서 미분불가능. } \downarrow \text{ 8점.}$$

※ 계산 실수 시 4점감점

$$i) \lim_{|v| \rightarrow 0} \frac{|f(v)|}{|v|} = \lim_{|v| \rightarrow 0} \frac{ab}{\sqrt{a^2 + b^2} (|a| + |b|)} \leftarrow \text{절댓값 빼는 경우}$$

$$ii) \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{2|t|} = \begin{cases} \frac{1}{2} & t > 0 \\ -\frac{1}{2} & t < 0 \end{cases} \text{ 이라고 서술하는 경우.}$$

iii)

$$D_{(1,1)} f(0,0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t,t) - f(0,0)}{\sqrt{2} t}$$


└ 불필요한 $\sqrt{2}$ 붙는 경우.

3.

f가 원점을 제외한 공간에서 일급 (C¹) 이므로 미분가능하고,

따라서 $D_{V^*} f(p) - D_V f(p) = D_{V^*-V} f(p) = \text{grad } f(p) \cdot (V^* - V)$

$r = \sqrt{x^2 + y^2}$ 이라 하고, $\text{grad } f(p) = \left(\frac{x}{r} \sinh r, \frac{y}{r} \sinh r, 2z \right)_p$
 $= \left(\frac{1}{2} \sinh(\log 3), \frac{\sqrt{3}}{2} \sinh(\log 3), \frac{4}{\sqrt{3}} \right)$
 $= \left[\left(\frac{2}{3}, \frac{2}{\sqrt{3}}, \frac{4}{\sqrt{3}} \right) \right]$ +5점



접평면

V^* 와 V 의 각이 120° 이고,

$\text{grad } f(p) \cdot V = D_V f(p) < 0$,

$\text{grad } f(p)$ 와 접평면이 수직.

즉 그림에서 $\text{grad } f(p)$ 는 (+) 방향이고, $V^* - V = \sqrt{3} \cdot \frac{\text{grad } f(p)}{|\text{grad } f(p)|}$ +5점

$|\text{grad } f(p)| = \frac{8}{3}$ 이고, ~~$D_{V^*-V} f$~~

$\text{grad } f(p) \cdot (V^* - V) = \sqrt{3} \cdot |\text{grad } f(p)| = \frac{8}{\sqrt{3}}$ +5점



*. 대괄호로 표시된 부분은 답안에 필수적이지 않음.

즉, $V^* - V = \frac{\text{grad } f(p)}{|\text{grad } f(p)|}$ 로 주장하여도, (+) 방향에 해당하는 5점 부여.

*. $\sinh(\log 3) = \frac{4}{3}$ 를 계산하지 않고 \sinh 로 ~~부딪히~~ 1보다도 큰 방향.

변재

1. 그림을 참조하여 $v^* - v$ 를 바르 구할 경우



$$\therefore D_{v^*-v} f(P) = \nabla f(P) \cdot (v^* - v)$$

$$= \nabla f(P) \cdot \sqrt{3} \frac{\nabla f(P)}{|\nabla f(P)|} = \sqrt{3} |\nabla f(P)| = \sqrt{3} \cdot \frac{8}{3}$$

2. 공식을 참조하여 v^* 를 v 와 $\nabla f(P)$ 로 표현해서 구할 경우

$$v^* = v - 2 \frac{v \cdot N}{N \cdot N} N \quad \text{여기 } N \text{은 } \nabla f(P) \text{가 돼야 한다.}$$

$$\therefore v^* - v = -2 \frac{|\nabla f(P)| \cos 150^\circ}{|\nabla f(P)|^2} \nabla f(P) = \sqrt{3} \frac{\nabla f(P)}{|\nabla f(P)|}$$

$$\Rightarrow D_{v^*-v} f(P) = \nabla f(P) \cdot (v^* - v) = \nabla f(P) \cdot \left\{ \sqrt{3} \frac{\nabla f(P)}{|\nabla f(P)|} \right\} = \sqrt{3} |\nabla f(P)| = \sqrt{3} \cdot \frac{8}{3}$$

*: v 와 N 사이의 각은 π 인 경우

방향이 맞다면 5점, 아니면 ~~문제에 의도한~~ 문제의 의도나 다르기 때문에 0점.

3. v^* 와 v 에서의 방향도함수를 각각 따로 구할 경우.

$$D_v f(P) = |\nabla f(P)| \cdot |v| \cdot \cos \frac{5}{6}\pi$$

$$D_{v^*} f(P) = |\nabla f(P)| \cdot |v^*| \cdot \cos \frac{\pi}{6}$$

#4. $f(x,y) = \frac{1}{x-y-1}$ 에 대하여 $D_{(a,b)}^4(0,0)$ 을 구하시오.

(풀이 1) $D_{(a,b)}^4(0,0) = \left. \frac{d^4}{dt^4} f(at, bt) \right|_{t=0}$ 5점
 $= \left. \frac{d^4}{dt^4} \left(\frac{1}{(a-b)t-1} \right) \right|_{t=0}$
 $= \left. \frac{24(a-b)^4}{((a-b)t-1)^5} \right|_{t=0}$ 5점
 $= -24(a-b)^4$ 5점

(풀이 2) $f(x,y)$ 는 원점에서 무한 급 함수이므로, 오일러 편미분 교환법칙에 의해
 $D_{(a,b)}^4(0,0) = a^4 D_1^4(0,0) + 4a^3b D_1^3 D_2(0,0) + 6a^2b^2 D_1^2 D_2^2(0,0)$
 $+ 4ab^3 D_1 D_2^3(0,0) + b^4 D_2^4(0,0)$ 5점

$f(x,y)$ 를 미분하면 $D_1^4(x,y) = D_2^4(x,y) = D_1^2 D_2^2(x,y) = \frac{24}{(x-y-1)^5}$
 $D_1^3 D_2(x,y) = D_1 D_2^3(x,y) = -\frac{24}{(x-y-1)^5}$ 5점

위의 결과에 $(x,y) = (0,0)$ 을 대입하면,

$$D_{(a,b)}^4(0,0) = -24a^4 + 96a^3b - 144a^2b^2 + 96ab^3 - 24b^4$$

$$= -24(a-b)^4$$
 5점

(풀이 3) $f(x,y) = -\frac{1}{1-(x-y)} = -\left[1 + (x-y) + (x-y)^2 + (x-y)^3 + (x-y)^4 + O((x^2+y^2)^2) \right]$ 5점

한편, 원점에서 $v=(x,y)$ 방향 테일러 다항식은

$$T_4 f(0,0, v) = f(0,0) + D_1 f(0,0) + \frac{1}{2!} D_1^2 f(0,0) + \frac{1}{3!} D_1^3 f(0,0) + \frac{1}{4!} D_1^4 f(0,0)$$

테일러 전개에 유일성에 의해, 4차 항을 비교하면

$$\frac{1}{4!} D_1^4 f(0,0) = -(x-y)^4$$
 5점

$$\therefore D_{(a,b)}^4 f(0,0) = -24(a-b)^4$$
 5점

* 테일러전개의 유일성을 설명하지 않고 풀거나 나머지항 $O((x^2+y^2)^2)$ 을 실수한 경우 -3점

* 잘못된 식을 전개하여 풀 경우, 2 뒤로 점수 없음

*5. $f(x,y) = (x^2+y^2)e^{\frac{-x^2+y^2}{2}}$: 임계점을 모두 구하고, 분류

Sol $\nabla f(x,y) = e^{\frac{-x^2+y^2}{2}} ((2-(x^2+y^2))x, (2+(x^2+y^2))y)$

따라서 (x,y) : 임계점 $\Leftrightarrow \begin{cases} (2-(x^2+y^2))x = 0 \\ (2+(x^2+y^2))y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} y=0 \\ x=0, \pm\sqrt{2} \end{pmatrix}$

: 임계점 $(0,0), (\sqrt{2},0), (-\sqrt{2},0)$ ① 각 +1

$$f''(x,y) = e^{\frac{-x^2+y^2}{2}} \begin{pmatrix} x^4+x^2y^2-5x^2-y^2+2 & -x^3y-xy^3 \\ -x^3y-xy^3 & y^4+x^2y^2+5y^2+x^2+2 \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow f''(0,0) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow$ 양정부호 \Rightarrow 극소점

$f''(\sqrt{2},0) = \begin{pmatrix} -\frac{4}{e} & 0 \\ 0 & \frac{4}{e} \end{pmatrix} = f''(-\sqrt{2},0) \rightarrow \det \begin{pmatrix} -\frac{4}{e} & 0 \\ 0 & \frac{4}{e} \end{pmatrix} < 0 \Rightarrow$ 안광점 ②
각 +4

채점기준

① ∇f 타 임계점 3개를 맞게 구하면 임계점 하나당 1점

② $f''(x,y)$ 타 극소, 안광을 $f''(0,0), f''(\pm\sqrt{2},0)$ 가리 맞게 구해서 판정하면
각각 +4 점

③ ① 의 결과가 맞아야 ② 에서 점수를 줄 수 있다. 즉. 틀리게 구한 임계점이, (바르게) 판정은 해도
점수는 없게 된다.

④ 헤세 판정을 쓰지 않고 맞는 논리를 써서 판정하면 점수 인정.

(ex, $(0,0)$ 은 $f(x,y) \geq f(0,0) = 0$ 이므로 극소.)

#6. (총 1)

① $S = \{ x, y, z \geq 0 \mid ax^2 + by^2 + cz^2 = 1 \}$ 은 유계 닫힌 집합이므로, 영역 S 에서 $x^r y^s z^t$ 는 최댓값을 갖는다. (최대최소 정리에 의해) +2

$f(x, y, z) = x^r y^s z^t$, $g(x, y, z) = ax^2 + by^2 + cz^2$ 이라 하자.

② S 위의 점들 중 x, y, z 중 하나가 0 이라면 $f(x, y, z) = 0$ 이다. +3

③ x, y, z 가 모두 양수 인 경우, g 의 1-등위면 상에서의 f 의 최댓값을 구하는 상황이므로 라그랑주 승수법을 적용할 수 있다. 또한 $x, y, z > 0$ 일때 $\text{grad } g(x, y, z) = (2ax, 2by, 2cz) \neq (0, 0, 0)$ 이므로, f 의 최댓값을 (x, y, z) 에서 가진다면 $\text{grad } f(x, y, z) = \lambda \text{grad } g(x, y, z)$ 가 성립. (이런 식이 가이려면) +4

$$\text{grad } f(x, y, z) = x^r y^s z^t \left(\frac{r}{x}, \frac{s}{y}, \frac{t}{z} \right)$$

$$\text{grad } g(x, y, z) = 2(ax, by, cz) \quad \therefore ax : by : cz = \frac{r}{x} : \frac{s}{y} : \frac{t}{z}$$

$$\therefore x = \sqrt{\frac{r}{a}} k, \quad y = \sqrt{\frac{s}{b}} k, \quad z = \sqrt{\frac{t}{c}} k.$$

$$ax^2 + by^2 + cz^2 = 1 \quad \text{일때} \quad k = \sqrt{\frac{1}{r+s+t}}.$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow f(x, y, z) &= \left(\sqrt{\frac{r}{a}} \cdot k \right)^r \left(\sqrt{\frac{s}{b}} \cdot k \right)^s \left(\sqrt{\frac{t}{c}} \cdot k \right)^t \\ &= \sqrt{\frac{r}{a}}^r \sqrt{\frac{s}{b}}^s \sqrt{\frac{t}{c}}^t \cdot \sqrt{\frac{1}{r+s+t}}^{r+s+t}. \end{aligned} \quad +4$$

④ ②와 ③의 값들 중 최댓값은 ③의 값이므로,

$$x^r y^s z^t \text{ 의 최댓값은 } \sqrt{\frac{r}{a}}^r \sqrt{\frac{s}{b}}^s \sqrt{\frac{t}{c}}^t \sqrt{\frac{1}{r+s+t}}^{r+s+t} \text{ 이다.} \quad +2$$

-*(표이 1)의 채점 기준.

- ①에서 "유계", "달린", "최댓값을 가진다"라는 말이 없으면 2점 부여 X
- 라그랑주 승수법 ($\text{grad } f = \lambda \text{grad } g$)을 적용하기 전에 ②의 case (S의 경계)를 고려하지 않은 경우, 답이 맞아도 ③에서 최대 4점만 부여하고 ④의 점수 부여 X
 (라그랑주 승수법을 적용한 후 단순 계산의 이유로 $x=0$ or $y=0$ or $z=0$ 의 case를 나눈 경우, 또는 $\text{grad } f=0$, $\text{grad } g=0$ 의 case를 나눈 경우 마찬가지로 점수 없음)
 (라그랑주 승수법을 적용하려면 515p. 정리 6.0.2.의 조건에 나와 있듯이 f 와 g 의 정의역은 연결 집합 (경계가 없는 집합) 이어야 함.
 지금의 경우 $U = \{(x, y, z) \mid x, y, z > 0\}$ 이어야 연결 집합이 됨.)

(표이 2)

$u+v+w=1$ 을 만족하는

가중치 산술 기하 부등식을 적용하면 양수 u, v, w 와 양수 A, B, C 에 대하여

$$uA + vB + wC \geq A^u B^v C^w \quad (\text{등호조건: } A=B=C)$$

가성립. $u = \frac{r}{r+s+t}, v = \frac{s}{r+s+t}, w = \frac{t}{r+s+t}, A = \frac{ax^2}{r}, B = \frac{by^2}{s}, C = \frac{cz^2}{t}$ 대입.

$$\Rightarrow \frac{1}{r+s+t} (ax^2 + by^2 + cz^2) \geq \left[\left(\frac{ax^2}{r} \right)^r \left(\frac{by^2}{s} \right)^s \left(\frac{cz^2}{t} \right)^t \right]^{\frac{1}{r+s+t}}$$

$$\Rightarrow x^r y^s z^t \leq \sqrt[r+s+t]{\left(\frac{r}{a} \right)^r \left(\frac{s}{b} \right)^s \left(\frac{t}{c} \right)^t} \cdot \frac{1}{(r+s+t)^{\frac{1}{r+s+t}}} \quad \dots (*)$$

등호조건 이 존재하면 $\left(\frac{ax^2}{r} = \frac{by^2}{s} = \frac{cz^2}{t} \right), \Leftrightarrow x = \sqrt{\frac{r}{a(r+s+t)}}, y = \sqrt{\frac{s}{b(r+s+t)}}, z = \sqrt{\frac{t}{c(r+s+t)}}$

(*)가 최댓값이 된다. } +15.

-*(표이 2)가 정수라고 가정할 경우 (ex. $ax^2 = \frac{ax^2}{r} + \dots + \frac{ax^2}{r}$), 등호조건이 명확하지 않은 경우, 가중치 산술 기하 부등식을 명확하게 적지 않은 경우 모두 0점.

7. (풀이 1) 함수 $h_1: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ 를 $h_1(t) = (t, 1)$ 로 정의하고
 함수 $h_2: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ 를 $h_2(s) = (1, s)$ 로 정의하자.

연쇄법칙에 의해

$$((G \circ F)(t, 1))' = ((G \circ F) \circ h_1)'(t) = (G \circ F)'(t, 1) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4t^3 \\ 2t \end{pmatrix}$$

$$((G \circ F)(1, s))' = ((G \circ F) \circ h_2)'(s) = (G \circ F)'(1, s) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4s^3 \\ +2s \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow (G \circ F)'(1, 1) = \begin{pmatrix} 4 & -4 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{⑦} \quad \begin{array}{l} \text{+6 (행렬을 전치행렬로 쓴 경우 3점만 부여)} \\ (G \circ F)'(t, s) = \begin{pmatrix} 4t^3 & -4s^3 \\ 2t & 2s \end{pmatrix} \text{ 등 0점부여} \end{array}$$

다시 연쇄법칙에 의해

$$(G \circ F)'(1, 1) = G'(F(1, 1)) \cdot F'(1, 1) = G'(2, 0) \cdot F'(1, 1)$$

$$\text{그런데 } G'(x, y) = \begin{pmatrix} y & x \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ 이므로 } G'(2, 0) = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{⑧} \quad \begin{array}{l} \text{+6} \end{array}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot F'(1, 1) = \begin{pmatrix} 4 & -4 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{(행렬을 전치행렬로 쓴 경우 3점만 부여)} \end{array}$$

$$\therefore F'(1, 1) = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 4 & -4 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & -4 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \quad \text{⑨} \quad \begin{array}{l} \text{⑦, ⑧에서} \\ \text{+3 (전치행렬로 쓴 경우에도 계산이 맞으면 3점 부여)} \end{array}$$

* ⑦ 또는 ⑧ 에서 0점을 받은 경우 ⑨에 점수 없음

* $(G \circ F)'(t, s)$, $F'(t, s)$ 등의 일반적인 경우에 대한 논증은 불가능하다

예를 들어, $F(t, s) = (t^2 + s^2 + (s-1)(t-1), t^2 s^2)$ 이면. $F(1, 1) = (2, 0)$

$(G \circ F)(t, s) = (t^4 - s^4 + (t^2 + s^2)(s-1)(t-1), t^2 + s^2 + (s-1)(t-1))$ 이므로

$(G \circ F)(t, 1) = (t^4 - 1, t^2 + 1)$, $(G \circ F)(1, s) = (-s^4 + 1, s^2 + 1)$ 를 만족한다

$$\text{그러나 } (G \circ F)'(t, s) \neq \begin{pmatrix} 4t^3 & -4s^3 \\ 2t & 2s \end{pmatrix} \text{ 이며 } F'(t, s) \neq \begin{pmatrix} 2t & 2s \\ 2t & -2s \end{pmatrix}$$

$$\left(\frac{\pi}{2} \text{이 } 2\right) \quad G(F(t,1)) = (t^4-1, t^2+1)$$

$$G(F(1,s)) = (-s^4+1, s^2+1) \quad \text{이므로}$$

$$F(t,1) = (t^2+1, t^2-1), \quad F(1,s) = (s^2+1, -s^2+1) \text{ 이다.}$$


$$\Rightarrow \left. \frac{d}{dt} F(t,1) = (2t, 2t) \right|_{t=1} = (2, 2) \quad \text{--- } \downarrow +6$$

* $F(t,s) = (t^2+s^2, t^2-s^2)$
라 가정하고 풀 경우
정수 없음.

$$\left. \frac{d}{ds} F(1,s) = (2s, -2s) \right|_{s=1} = (2, -2) \quad \downarrow +6$$

$$\therefore F'(1,1) = \left(\left. \frac{d}{dt} F(t,1) \right|_{t=1}, \left. \frac{d}{ds} F(1,s) \right|_{s=1} \right) = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \quad \downarrow +3$$

8번. < 끝점 구하기 >



주의: "원점 중심 회전"

$$\frac{\pi}{6} \text{ 점: } 3 \cdot \left(\cos \frac{\pi}{6}, \sin \frac{\pi}{6} \right) = \left(\frac{3\sqrt{3}}{2}, \frac{3}{2} \right)$$

$$\& 1 \cdot \left(\cos \frac{7\pi}{6}, \sin \frac{7\pi}{6} \right) = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2} \right)$$

< 선적분 계산 >

① $\frac{(-y, x)}{x^2+y^2} \Rightarrow$ 각원소 벡터장: $\int_X \frac{(-y, x)}{x^2+y^2} ds = \frac{7\pi}{6} - \frac{\pi}{6} = \pi$ (돌아간 각도)
(나중) (처음).

② $\varphi(x, y) = \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{2}x^2y^2 + \frac{1}{4}y^4$ 으로 정의하자.

$\rightarrow \nabla\varphi = (x^2+y^2)(x, y) \quad \therefore \varphi$ 는 $(x^2+y^2)(x, y)$ 의 잠재함수

한편, $\varphi(x, y) = \frac{1}{4}(x^2+y^2)^2 = \frac{1}{4}r^4$ (극좌표 (r, θ) 사용시)

$\therefore \int_X (x^2+y^2)(x, y) ds \stackrel{\text{선적분의 기본정리}}{=} [\varphi(r)]_{r=3}^{r=1} = \left[\frac{1}{4}r^4 \right]_3^1 = \frac{1}{4} - \frac{81}{4} = -20.$

By ①, ②, $\int_X F(x, y) ds = \boxed{\pi - 20}$.

[별책]

• 회전된 반타원의 매개화를 잘 구할시 (3점)
(단, 잠재함수 φ 점수 3점과 중복 불가.)

$$X(t) = \left(\sqrt{3} \cos t - \frac{\sqrt{3}}{2} \sin t + \frac{\sqrt{3}}{2}, \cos t + \frac{3}{2} \sin t + \frac{1}{2} \right) \quad (0 \leq t \leq \pi)$$

< 채점기준 >

• 끝점 2개 각각 2점 (총 4점). 답이 맞아야 인정.

• 각원소벡터장 적분 = π (3점). 단, 원점을 지나는 적분경로를 설정했을 시 0점.

• 잠재함수 $\varphi(r) = \frac{1}{4}r^4$ (3점)

• 올바른 과정을 통해 " $\pi - 20$ " 이라는 답을 내린 경우. (5점) } 총 15점.
(논리적 오류 발견시 $\pi - 20$ 을 구해도 정답 인정 불가.)

9.

(a) 참.

\vec{F} 의 장재함수를 $\varphi: U \rightarrow \mathbb{R}$ 이라 하면 $\vec{F} = \text{grad } \varphi$ 이다.

일급곡선 $X(t): [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ 이 닫혀있으므로 $X(a) = X(b)$ 이다.

따라서 선적분 기본정리에 의해

$$\int_X \vec{F} \cdot d\vec{s} = \int_a^b \vec{F}(X(t)) \cdot X'(t) dt = \int_a^b \text{grad } \varphi(X(t)) \cdot X'(t) dt = \varphi(X(b)) - \varphi(X(a)) = 0 \text{ 이다. } \quad \text{+6}$$

(b) 거짓.

$$\vec{F}(x, y) := \frac{(-y, x)}{x^2 + y^2} \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}) \text{ 으로 정의하면, } \quad \text{+2}$$

$$D_1 F_1 = \frac{\partial}{\partial y} \left(-\frac{y}{x^2 + y^2} \right) = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}, \quad D_1 F_2 = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{x^2 + y^2} \right) = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} \Rightarrow D_1 F_1 = D_1 F_2 \text{ 이므로 } \vec{F} \text{ 는 닫혀있다. } \quad \text{+2}$$

그러나 일급곡선 $X(t) := (\cos t, \sin t) \quad (t \in [0, 2\pi])$ 에 대해

$$X \text{ 는 닫힌 곡선이지만 } \int_X \vec{F} \cdot d\vec{s} = \int_0^{2\pi} (-\sin t, \cos t) \cdot (-\sin t, \cos t) dt = 2\pi \neq 0 \text{ 이어서}$$

(a) 에 의해 \vec{F} 는 장재함수를 가지지 않는다. +3

(c) 참.

(표이 1) (b)의 계산에 의해 \vec{F} 는 닫혀있고, 주어진 U 는 열린 볼록집합이므로

푸앵카레 도형정리에 의해 \vec{F} 는 장재함수를 가진다. +7

(표이 2) $\varphi: U \rightarrow \mathbb{R}$ 을 $\varphi(x, y) := \arctan(\frac{y}{x})$ 라 두면 간단한 계산에 의해 $\vec{F} = \text{grad } \varphi$ 이다.

$\therefore \varphi$ 는 \vec{F} 의 장재함수이다. +7

[세부 채점 기준] (b) 각원소 벡터장이 아닌 올바른 예시를 들었을 경우, 구체적인 계산이 없으면 -5

(c) (표이 1)에서 (\vec{F} 의 닫힘) 또는 (U 의 볼록성) 중 하나가 빠진 경우 -2

[10] $X(t) = (t - \sin t, 1 - \cos t, t)$ $0 \leq t \leq 2\pi$ 에 대한 선적분

$$\int_X yz \, dx - xz \, dy \text{ 를 구하시오.}$$

(모범 답안)

$yz \, dx - xz \, dy$ 에 대응되는 벡터장은

$$F(x, y, z) = (yz, -xz, 0) \text{ 이다.}$$

$$\int_X yz \, dx - xz \, dy = \int_X F(x, y, z) \cdot ds$$

$$\left[\begin{array}{l} \int t^2 \sin t \, dt \\ = -t^2 \cos t + \int 2t \cos t \, dt \\ \int t \cos t \, dt \\ = t \sin t - \int \sin t \, dt \\ = t \sin t + \cos t \end{array} \right]$$

$$\begin{aligned} &= \int_0^{2\pi} F(X(t)) \cdot \underbrace{X'(t)}_{(1-\cos t, \sin t, 1)} \, dt \\ &= \int_0^{2\pi} ((1-\cos t) \cdot t, -(t-\sin t) \cdot t, 0) \cdot (1-\cos t, \sin t, 1) \, dt \\ &= \int_0^{2\pi} (2t - 2t \cos t - t^2 \sin t) \, dt \\ &= \left[t^2 - 2(t \sin t + \cos t) - \{-t^2 \cos t + 2(t \sin t + \cos t)\} \right]_0^{2\pi} \\ &= \left[t^2 + t^2 \cos t - 4t \sin t - 4 \cos t \right]_0^{2\pi} \\ &= 4\pi^2 + 4\pi^2 = 8\pi^2 \quad + 7 \end{aligned}$$

(채점 기준)

선적분 식을 곡선의 매개변수 t 에 대한 식으로 맞게 변환한 경우 + 8점.
계산을 정확하게 하고 답을 흥게 쓴 경우 + 7점

총 15점.

(*) 만약 $\int_X yz \, dx$ 와 $\int_X xz \, dy$ 를 따로 계산한 경우, 각 경우에 대해 매개변수 t 에 대한 변환이 모두 맞은 경우 + 8점.
하나라도 틀린 경우 부분점수 없음.